



AGOSTO
2025

GAVIOTÍN CHICO

(*Sterna lorata*)



NOMBRE CIENTÍFICO:
Sterna lorata

NOMBRE COMÚN:
Gaviotín Chico

FAMILIA:
Laridae



El Gaviotín Chico es una especie de ave Charadriiforme que suele vivir en el pacífico sur. Mide unos 24 cm. de largo, desde su pico hasta la cola. Pesa solo 50 grs., a la vista humana hembras y machos son iguales, por lo que no se puede diferenciar el sexo entre ellos.



- ASPECTO:**
- Plumaje gris con alas largas y angostas.
 - Cabeza y nuca negras con antifaz.
 - Cara blanca.
 - Pico anaranjado con punta negra.
 - Patas palmeadas y uñas negras.

ALIMENTACIÓN: El Gaviotín Chico se alimenta principalmente de anchovetas (*Engraulis sp.*)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Asociada a la corriente de Humboldt, desde el norte del Perú hasta la Región de Antofagasta, Chile. Presencia durante la temporada no reproductiva también en el centro-norte de Ecuador (Ecuasal-Salinas).

HÁBITATS UTILIZADOS:

- Playas arenosas y dunas costeras.
- Desiertos pedregosos estériles, a menudo a varios kms. de la costa.
- Áreas frecuentemente ubicadas a más de 1.000 mts. de la línea de marea.

ADAPTACIONES:

- Vuelo ágil para evadir depredadores.
- Pesca en picada.
- Puede descansar sobre algas flotantes.



SITIOS CONOCIDOS DE NIDIFICACIÓN:

- Solo se reconocen 3-4 sitios de nidificación en Perú.
- En Chile, hay tres sitios de nidificación, siendo uno de ellos cercano a la Península de Mejillones.

CONDICIONES DEL HÁBITAT DE NIDIFICACIÓN:

- Desiertos pedregosos estériles, alejados del mar.
- Ambientes vulnerables a alteraciones humanas.



FUENTES

Ficha Clasificación de Especies MMA:
https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Ficha_Web_Sternalorata.pdf
iNaturalist Chile:
<https://inaturalist.mma.gob.cl/taxa/144533-Sternula-lorata>
Fundación Gaviotín Chico:
<https://gaviotinchico.cl/el-gaviotin-chico/>



CLASIFICACIÓN UICN (2005):
En Peligro
TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO:
Entre 1.000 y 2.400 individuos.
REDUCCIÓN POBLACIONAL: Más del 70% en los últimos 10 años.



AMENAZAS IDENTIFICADAS:

- Disminución de los stocks de anchoveta.
- Destrucción de su hábitat de nidificación, debido a:
 - Construcciones.
 - Vehículos todo terreno.
- Presión por uso del territorio.



Crédito Fotografías: Oscar Díaz @capacascar, Ernesto Málaga-Arenas, cschulbe, Fundación Gaviotín Chico



Licencia CC BY-NC:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>